

### **Bilag 3 (praktisk anvendelse og håndtering af DNase (Pulmozyne®)):**

Intrapleural Actilyse (alteplase) 10 mg x 2 dagligt i 3 dage samt

Intrapleural Pulmozyne (DNase) 5 mg x 2 dagligt i 3 dage

Begge lægemidler efterlades i pleurahulen i 1 time 2 gange dagligt (dræn afklemmes eller lukkes med 3-vejshane). Instillationen af lægemidlerne skal ske forskudt med mindst 2 timer for at undgå tilblanding.

Tilberedning af Actilyse (alteplase) foregår ved opløsning af 10 mg Actilyse (alteplase) i medfølgende solvens (10 ml) i 50 ml sprøjte. Herefter fortyndes blandingen med isoton NaCl til i alt 30 ml. Injiceres herefter i pleuradrænet (enten via 3-vejshane hvis der anvendes pigtailkateter, eller direkte i drænet efter passende afklemning med pean).

Tilberedning af Pulmozyne (DNase) foregår ved at 5 ml Pulmozyne 1 mg/ml (= 2 plasticbeholdere) inhalationsvæske trækkes op i 50 ml sprøjte. Herefter fortyndes blandingen med isoton NaCl til i alt 30 ml. Injiceres herefter i pleuradrænet (enten via 3-vejshane hvis der anvendes pigtailkateter, eller direkte i drænet efter passende afklemning med pean).